

Tid till noradrenalin vid sepsis: en prospektiv kohortstudie



Information till studiedeltagare

Bakgrund och syfte

Sepsis, även kallat blodförgiftning, är en mycket allvarlig infektion som påverkar hela kroppen och gör att kroppens livsviktiga organ såsom hjärna, hjärta och njurar sviktar. Vid sepsis rekommenderas idag att man ger läkemedlet noradrenalin tidigt i sjukdomsförloppet för att hålla patientens blodtryck tillräckligt högt. Vi vill undersöka hur lång tid det tar från att man kommer till akutmottagningen med sepsis och lågt blodtryck till dess att patienter får noradrenalin.



Vad ska studeras?

Vi kommer studera hur lång tid det tar för patienter med sepsis och lågt blodtryck att få läkemedlet noradrenalin. Vi kommer också mäta hur mycket intravenös vätska patienterna får, om man överlevt 90 dagar. Vi kommer också samla in bakgrundsdata som ålder, kön och tidigare sjukdomar. All datainsamling sker via journalen och data kommer förvaras säkert och enbart forskare som är ansvariga för studien kommer ha tillgång till den.



För mer information om studien, var god scanna QR-koden med din mobilkamera.

Vilka blir studiedeltagare

Alla vuxna patienter som har sepsis och lågt blodtryck på akutmottagningen kommer bli inkluderade. Anledningen till att alla blir inkluderade är att sepsis påverkar kroppen så att man kan bli förvirrad eller väldigt trött och därför inte alltid kan bli tillfrågad. Det är viktigt att studera den här utsatta patientgruppen och därför frågar vi inte alla aktivt om de vill delta. Däremot kan man själv välja att inte vara med. Hör då av dig till ansvarig forskare. Kontaktuppgifter finns nedan.